

Cultura	L / ha	Numarul de aplicari pe frunze si timpii de aplicare			
		Prima aplicare	A doua aplicare	A treia aplicare	A patra aplicare
Legume, leguminoase, cereale					
Cartof	2	50% rasarire	Aparitia tuberculului	Dezvoltarea tuberculului	La inceputul infloririi
Varza, brocoli, nap, conopida	2	Stadiul de a 3-a frunza	Stadiul de 6-8 frunze	Dupa 10-14 zile	La formarea timpuriei a capului
Ceapa, usturoi, praz, hasma	2	50% la rasarire	Stadiul de 2-3 frunze	Debutul bulbului	La dezvoltarea bulbului
Castravete, dovlecel, dovleac, pepeni	2	Stadiul de 3-5 frunze	Dupa 7-10 zile	Pre-inflorire	Stadiul de crestere
Fasole, linte,mazare	2	Stadiul de a 3-a frunza	La 9 sau mai multe frunze	Pre-inflorire	La inceputul formarii pastailor
Morcov, sfecla, ghimbir, ridiche	2	Stadiul de a 3-a frunza	Dupa 2 saptamani	Dezvoltarea radacinii	Dupa 14 zile
Tomate, ardei, vinete, bame	2	Rasad de 21-28 zile	Dupa 7-10 zile	Pre-inflorire	La aparitia fructului
Salata, telina, spanac, patrunjel	1-2	Rasad de 14-21 zile	Dupa 7 zile	Planta in varsta de 35 zile	
Orez, orz, sorg, ovaz	2	Stadiul de a 4-a frunza	Stadiul primului nod	La stadiul de spic	
Hamei	2	Boabe situate la 10% fata de varf	Boate situate la 30% distanta de varf	La 21 de zile dupa a 2-a aplicare	
Lucerna, plante furajere	2	La 6-10 cm inaltime	Dupa 7 zile	La 7 zile dupa prima recoltare	
Grau de toamna si primavara	2	Stadiul de la 4-5-a frunza	Stadiul primului nod	La stadiu de spic	
Porumb si porumb dulce	2	Stadiul de la 4-5-a frunza	Stadiul de a 8-a frunza	Inaintea aparitiei florii (matasea de porumb)	
Rapita uleioasa	2	Stadiul de la 4-5-a frunza	La deschiderea primei flori		
Floarea soarelui	2	La 10 zile dupa semanare	Dupa 30 zile	In timpul fazei de inflorire	
Soia	2	Stadiul de a 3-a frunza	Dupa 5-7 zile	:La 9 sau mai multe frunze	
Sparanghel	2	Imediat dupa rasarirea tulpinii	Dupa 7 zile	La fiecare 14 zile, in timpul cresterii, dupa recoltare	
Culturi de sera si ornamentale	1-2	1.5 L /500 litri apa la hectar. La fiecare 14 zile sau dupa fiecare taiere sau la boboc nou			
Rasaduri	1	5 L / 500 litri de apa la hectar - aplicat la inceputul formarii radacinii, apoi se urmati indicatiile de mai sus.			
Pomi si arbusti fructiferi	L / ha	Prima aplicare	A doua aplicare	A treia aplicare	A patra aplicare
Afine, agrise, coacaze	2	Pre-inflorire	La caderea petalelor	La fiecare 7 zile, in timpul formarii fructului	La modificare culorii fructului
Pere	2-3	Muguri florali vizibili	Dupa cadera florilor	La o saptamana dupa caderea florilor	La fruct de 1 - 1.5 cm
Meri	2	Pre-inflorire / pre-inmugurire	Dupa cadera florilor	La fruct de 10-12mm	La 2-4 saptamani inainte de recoltare
Piersici, nectarini, caisi, pruni	2	Pre-inmugurire - mugure roz/alb	La caderea petalelor	La formarea fructului	La formarea fructului, 0.5-1cm
Struguri de masa	2	La noduri de 18-20 cm	La stadiul de pre-inflorire	La stadiul de post-inflorire	La finalizarea formarii ciorchinelui
Struguri pentru vin si stafide	2-3	La stadiu de pre-inflorire	La stadiul post-inflorire	Dupa caderea caliptrelor (tesutul care acopera varful radacinii)	La stadiul de colorare a fructului
Nuci, aluni, castani	2	La inceputul infloririi	La dezvoltarea a 7.5% din greutatea miezului fructului	Dupa 14 zile de la maturarea fructului	La 28 de zile dupa a 2-a aplicare
Ciresi, visini	2	La caderea petalelor	La caderea involisului de protectie	La stadiulde fruct galben-pal	
Capsuni, zmeura, merisoare	2	La pre-inflorire	La inflorirea totala	3 aplicari la fiecare 10 zile , pana la prima recoltare	