

CLINIC XPERT

erbicid total

Omologat în România cu certificat de omologare
nr. 243PC/20.10.2016



Conține:
Glifosat 360 g/l



Mod de acțiune:
Sistemic



Formulare:
Concentrat solubil (SL)



Temperatura de aplicare:
-



Cultura:
Multiple



Termen de valabilitate:
2 ani



Timp de pauză:
14 zile pentru rapiță și in; 8 zile pentru muștar; 7 zile pentru grâu, orz, ovăz și mazăre.

Mod de acțiune



CLINIC XPERT este un erbicid total, neselectiv, cu acțiune sistemică ce controlează toate speciile de buruieni anuale și perene aparute înainte de insamantare, plantare sau recoltare. Absorbția se face prin frunze și produsul este translocat în toate organele plantei, inclusiv rădăcini, stoloni, rizomi. **CLINIC XPERT** distrugă în totalitate partile aeriene și subterane ale buruienilor vizate.

Recomandări de utilizare



În România, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURĂ	Buruienile combatute	Doza de utilizare (L de produs/ha) min/max	MOMENTUL APLICĂRII
Grau, orz, grau durum, ovaz		4 L/ ha	Se aplică cu 7 zile înainte de recoltare
Grau, orz, ovaz, rapita, mustar, sfecla de zahăr, inul pentru samanta. Ceapa pentru bulbi, mazare de camp, praz	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene	1.5 l/ ha	Se aplică înainte de răsărirea culturii



Aplicarea pe miriști.

După recoltare, se eliberează terenul de resturi vegetale, iar când buruienile au ajuns la înălțimea de 15 – 25 cm se va aplica tratamentul cu **Clinic Xpert**.

În situații în care buruienile sunt stresate termic sau hidric sau acestea sunt în stadiu mai avansat de dezvoltare, erbicidul se aplică asociat cu un adjuvant. Se va evita driftul la aplicarea tratamentului pentru protejarea culturilor învecinate. Pentru combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate anuale, acestea trebuie să aibă cca. 5 cm sau 2 frunze adevărate bine dezvoltate.

Buruieni combătute:

CLINIC Xpert este un erbicid total ce controlează toate speciile de buruieni anuale și perene răsărite înainte de însamantare sau plantare.

Important



- Trebuie să treaca minim 6 ore de la aplicarea tratamentului fără să plouă.
- Nu se va aplica tratamentul în condiții de vânt deoarece soluția poate ajunge pe culturile învecinate sau pe plantele de cultură, distrugându-le.
- Nu se va aplica tratamentul pe buruieni imbatranite, acoperite de praf sau rouă, când creșterea este afectată de secetă, temperatură ridicată sau prea scăzută deoarece eficacitatea poate fi compromisă.
- Nu amestecați, aplicăți sau pastrăți produsul în containere galvanizate sau din otel.

